

Centre de Néphrologie et Transplantation Rénale

Chef de service

Professeur Philippe BRUNET
philippe.brunet@ap-hm.fr

Marseille, le 19/04/2021

Professeurs des Universités

Professeur Bertrand DUSSOL
Professeur Stéphane BURTEY
Professeur Valérie MOAL
Professeur Noémie JOURDE-CHICHE

Maître de Conférence des Universités

Docteur Thomas ROBERT

Praticiens hospitaliers

Docteur Tristan LEGRIS
Docteur Marion SALLEE
Docteur Marion PELLETIER
Docteur Nicolas SETBON

Chefs de Clinique Assistants

Docteur Marion GULLY
Docteur Guillaume LANO
Docteur Violaine SCARFOGLIERE
Docteur Romain VIAL

Praticiens Attachés

Professeur Yvon BERLAND
Docteur Dammar BOUCHOUAREB
Docteur Chebli EL HAJJ
Docteur Raphaël GODEFROY
Docteur Pascale SEBAHOUN
Docteur Ariane DUVAL-SABATIER
Docteur Clarissa VON KOTZE

Secrétariat

Tél. 04 91 38 30 43
04 91 38 30 42
04 91 38 30 49
04 91 38 30 71
Fax. 04 91 38 32 06

Secrétariat Dialyse

Tél. 04 91 38 40 95
Fax 04 91 38 11 12

Secrétariat Consultations

Tél. 04 91 38 31 87
04 91 38 39 27
Fax 04 91 38 36 30

Hospitalisations

Insuffisance Rénale Chronique

Néphrologie Clinique

1^{er} étage

Tél. 04 91 38 30 44

Unité de Greffe 3^{ème} étage

Tél. 04 91 38 30 45

Soins Intensifs 3^{ème} étage

Tél. 04 91 38 30 46

Hôpital de Jour Rez-de-chaussée

Tél. 04 91 38 30 34

Dialyse Péritonéale

Tél : 04 91 38 40 29

Hémodialyse 1^{er} étage

Kolff A 04 91 38 40 93

Kolff B 04 91 38 41 61

Kolff C 04 91 38 41 98

Kolff D 04 91 38 41 59

Hémodialyse 2^{ème} étage

Kolff E 04 91 38 41 82

Kolff F 04 91 38 41 15

Kolff G 04 91 38 41 07

Kolff H 04 91 38 41 58

Recommandations concernant la vaccination contre le SARS-CoV2 chez les patients greffés

Madame, Monsieur,

D'après les données publiées récemment, le schéma vaccinal en deux injections espacées d'un mois par les vaccins Pfizer® ou Moderna® a une efficacité de moins de 50% chez les patients transplantés rénaux. En d'autres termes, après deux injections de vaccin la moitié des transplantés rénaux ne bénéficient pas d'une couverture efficace contre le SARS-CoV2.

Les recommandations nationales sont donc d'effectuer une troisième injection pour les patients transplantés rénaux, et ce à partir de 1 mois après la deuxième injection (et si cela fait plus d'un mois, le plus tôt possible).

Nous vous recommandons donc de vous rapprocher du centre de vaccination dans lequel vous avez été vacciné afin de recevoir cette troisième injection.

En cas de difficultés pour obtenir cette troisième dose de vaccin vous pouvez contacter votre néphrologue référent.

Il est également recommandé que les personnes adultes vivant sous votre toit soient vaccinées. Si nécessaire un certificat médical pourra être établi par votre néphrologue référent.

Enfin, nous vous rappelons que même vaccinés vous devez impérativement maintenir les gestes barrières.

L'équipe médicale du Centre de néphrologie et de transplantation rénale.